

湖北文理学院 2022 年专升本《内科护理学》试卷（样卷）

姓名：

考试时间：90 分钟

题目	一	二									总分
满分	70	30									100
得分											

一、单选题（本大题共 35 小题，每小题 2 分，共 70 分）

1. 风湿性心脏瓣膜病最容易累及的瓣膜是
A. 主动脉瓣 B. 肺动脉瓣 C. 二尖瓣 D. 三尖瓣
2. 病人，女性，50 岁，因心力衰竭入院，诊断为心功能 II 级，病人应表现为：
A. 不能从事任何体力活动 B. 日常活动后出现呼吸困难，休息后缓解
C. 轻微活动后出现呼吸困难，休息后不易缓解 D. 一般活动后不引起疲乏，呼吸困难
3. 某急性发作重度的支气管哮喘患者，其首选药物是
A. 氨茶碱 B. 地塞米松 C. 沙丁胺醇 D. 色甘酸钠
4. 出现洋地黄毒性反应后首要的处理措施是
A. 补钾 B. 电复律 C. 应用利多卡因 D. 停用洋地黄药物
5. 患者，女，60 岁。静脉补液后，护士为其测中心静脉压为 13.5cmH₂O，血压正常，尿量 11ml/小时，尿比重<1.010。根据数据结果，考虑患者可能出现的情况是
A. 肺水肿 B. 弥散性血管内凝血 C. 酸中毒 D. 肾功能不全
6. 急性心肌梗死后，心律失常发生率最高的时间为
A. 1~3 天 B. 4~7 天 C. 2 周以内 D. 24 小时内
7. 40 岁女性患者，因近 1 个月怕热、多汗、情绪激动，且经常腹泻、心悸而门诊检查。体检：甲状腺肿大，两手微抖，眼球稍突。实验室检查：T₃ 6.2nmol/L，T₄ 254nmol/L。诊断为甲状腺功能亢进收入院。你认为下列哪项不属护理诊断
A. 焦虑 B. 营养失调 C. 甲状腺肿大 D. 自我形象紊乱
8. 大量咯血是指
A. 一次咯血量<100ml B. 一次咯血量>300ml
C. 一次咯血量>200ml D. 一次咯血量>100ml
9. 糖尿病酮症酸中毒的诱因不包括
A. 胰岛素过量 B. 外伤及手术 C. 妊娠及分娩 D. 感染
10. 患者女性 68 岁，近一个月来厌食，皮肤瘙痒。查尿蛋白(+++)，血肌酐指数 820μmol/L，诊断为慢性肾功能不全尿毒症期。护士对其皮肤瘙痒的护理措施错误的是
A. 勤换内衣 B. 洗澡后涂抹润肤霜
C. 用碱性强的肥皂彻底清洗皮肤 D. 用温水擦洗皮肤
11. 急性肾衰少尿期或无尿期易引起高钾血症，其危害是

- A. 高血压
C. 抑制心肌细胞易导致严重心律失常
D. 全身水肿
- B. 急性左心衰
12. 急性特发性血小板减少性紫癜的临床表现不包括
A. 多见于儿童
B. 急性腹痛、关节痛
C. 常有发热
D. 皮肤粘膜出血
13. 成人缺铁性贫血最常见的原因
A. 饮食中缺铁
B. 需铁量增加
C. 慢性失血
D. 铁吸收不足
14. 由于内分泌疾病患者的神经、精神症状改变较突出，护理时安慰患者焦虑情绪的最佳措施
A. 进行心理疏导
B. 给予地西洋
C. 减少探视
D. 促进睡眠
15. 下列哪项不是胃肠粘膜的损害因素
A. 非甾体类药物
B. 吸烟
C. 过度精神紧张
D. 前列腺素
16. 甲状腺功能亢进症患者一般不出现哪项消化系统症状
A. 食欲亢进
B. 肝脏肿大
C. 大便干结
D. 营养不良
17. 患者，63岁，睡醒后发现一侧偏瘫，神志清楚，血压150/98mmHg，脑脊液正常。应考虑为
A. 脑出血
B. 脑血栓形成
C. 脑栓塞
D. 蛛网膜下腔出血
18. 哮喘持续状态是指严重哮喘持续多长时间
A. 6小时
B. 10小时
C. 24小时
D. 48小时
19. 心衰最常见的诱因
A. 心律失常
B. 感染
C. 血容量增加
D. 身心过度劳累
20. 治疗肝性脑病时，灌肠时应禁用
A. 肥皂水
B. 生理盐水
C. 石蜡油
D. 弱酸溶液
21. 引起再生障碍性贫血最常见的抗生素药物是
A. 氯霉素
B. 氯丙嗪
C. 磺胺甲基异恶唑
D. 保泰松
22. 与消化溃疡发生关系密切的细菌是
A. 链球菌
B. 霍乱弧菌
C. 幽门螺旋杆菌
D. 痢疾杆菌
23. 癫痫大发作可以减药的情况是
A. 癫痫发作停止1年后
B. 癫痫发作停止2年以上
C. 脑电图正常后
D. 服药2年以上
24. 我国肝硬化最常见的原因
A. 酒精中毒
B. 药物中毒
C. 甲型肝炎
D. 乙型肝炎
25. 下面关于尿路刺激征的描述，错误的是
A. 尿意频繁而尿量不多为尿频
B. 一有尿意急不可待要排尿为尿急
C. 排尿时会阴下腹尿道感到烧灼感为尿痛
D. 尿频伴尿急称为尿路刺激征
26. 蛛网膜下腔出血最具有特征性的表现是
A. 剧烈头痛
B. 呕吐
C. 脑膜刺激征
D. 短暂意识障碍
27. 糖尿病的基本病理变化是
A. 生长激素分泌过多
B. 甲状腺素分泌过多
C. 胰升糖素分泌过多
D. 胰岛素绝对或相对不足

28. 右心功能不全引起的呼吸困难是由于
 A. 气道反应性增强 B. 支气管狭窄及阻塞
 C. 肺循环淤血 D. 体循环淤血
29. 高血压危象紧急处理的关键是
 A. 迅速降低血压 B. 绝对卧床休息 C. 限制钠盐的摄入 D. 给予氧气吸入
30. 2型糖尿病患者最常见的死因是
 A. 感染 B. 低血糖 C. 糖尿病肾病 D. 心脑血管意外
31. 类风湿性关节炎关节病变的特点是
 A. 大关节 B. 关节畸形 C. 游走性疼痛 D. 对称性改变
32. 引起上消化道出血的最常见病因为
 A. 急性胃粘膜病变 B. 胃癌 C. 消化性溃疡 D. 食道静脉曲张破裂出血
33. 下列白血病护理措施中不妥的一项是
 A. 注意病室消毒，预防感染 B. 定时进行口鼻清洁，清除血痂
 C. 增加营养，补充热量 D. 重视心理护理，避免不良刺激
34. 有关肾型过敏性紫癜，下列哪项是对的
 A. 多在紫癜型发生前2周出现尿液改变
 B. 少数病人可在数周内恢复
 C. 多数病人可迁延数月
 D. 极少数发生尿毒症
35. 成人最常见的肺结核类型是
 A. 原发性 B. 血行播散型 C. 浸润型 D. 结核性胸膜炎

二、多选题(本大题共10小题，在每小题的四个备选答案中，选出二至四个正确答案，并将其号码分别写在题干的括号内。多选、少选、错选均不得分。每小题3分，共30分)

36. 慢性呼吸衰竭的主要护理诊断为
 A. 气体交换受损 B. 自理能力缺陷 C. 潜在的感染 D. 有皮肤完整性受损的危险
37. 缩唇呼吸时，应
 A. 用鼻吸气 B. 用口呼气
 C. 呼与吸时间之比为2:1-3:1 D. 加快呼气
38. 治疗心绞痛的常用药物有
 A. 硝酸酯类制剂 B. 钙离子拮抗剂 C. β受体阻滞剂 D. 吗啡制剂
39. 流行性乙型脑炎患者，惊厥和抽搐的原因是
 A. 脑实质炎症 B. 脑缺氧 C. 脑水肿 D. 高热
40. 消化性溃疡常见的并发症有
 A. 大量出血 B. 急性穿孔 C. 幽门梗阻 D. 癌变
41. 肝性脑病患者的护理，正确的是
 A. 禁蛋白质饮食 B. 禁用水合氯醛 C. 大量补液 D. 快速利尿

- 42.急性白血病出血的主要原因有
 A. 血小板减少 B. 凝血因子合成减少
 C. 播散性血管内凝血 D. 白血病细胞浸润
- 43.关于浸润性突眼, ()是不正确的。
 A. 与自身免疫无关 B. 仅与甲亢同时存在
 C. 甲亢病情控制后, 浸润好转 D. 突眼双侧对称
- 44.()中毒时, 可用 2%碳酸氢钠溶液洗胃。
 A.敌敌畏 B.乐果 C.敌百虫 D.对硫磷(1605)
- 45.多尿可见于
 A. 糖尿病 B. 急性肾功能衰竭早期
 C. 库欣氏综合症 D. 慢性肾脏病进入肾功能减退期

湖北文理学院 2022 年专升本《内科护理学》试卷（样卷）

参考答案

答题卡:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	C	D	D	D	C	B	A	C	C	B	C	A	D	C	B	C	B	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
A	B	B	D	D	C	D	D	A	D	D	C	B	D	C					

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
ABD	ABC	ABC	ABCD	ABCD	AB	AC	ABCD	ABD	AD